

Fresubin 1800 Complete

1,2
kcal/ml




≥ CH 5

↓↓
≥ CH 8

Nährwertdeklaration

Durchschnittlicher Gehalt		100 ml
Energie	kcal (kJ)	120 (508)
Fett (30 Energie%)	g	4,1
davon gesättigte Fettsäuren	g	0,3
davon einfach ungesättigte Fettsäuren	g	2,8
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	1
davon EPA* + DHA**	g	0,05
Kohlenhydrate (47 Energie%)	g	14
davon Zucker	g	1,2
davon Laktose	g	≤ 0,04
Ballaststoffe (3 Energie%)	g	2
Eiweiß (20 Energie%)	g	6
Salz (Na x 2,5)	g	0,38
Wasser	ml	80
Osmolarität	mosmol/l	345
Mineralstoffe und Spurenelemente		
Natrium	mg	153
Chlorid	mg	137
Kalium	mg	223
Calcium	mg	85
Phosphor	mg	73
Magnesium	mg	30
Eisen	mg	2
Zink	mg	1,5
Kupfer	mg	0,2
Jod	µg	20
Selen	µg	10
Mangan	mg	0,4
Chrom	µg	10
Molybdän	µg	15
Fluorid	mg	0,2
Vitamine und andere Stoffe*		
Vitamin A	µg RE°	138
davon Beta-Carotin	µg RE°	33
Vitamin D	µg	2
Vitamin E	mg α-TE°°	2
Vitamin K	µg	10
Vitamin C	mg	10
Vitamin B ₁	mg	0,2
Vitamin B ₂	mg	0,26
Vitamin B ₆	mg	0,24
Niacin	mg/mg NE°°°	1,3/2,3
Folsäure	µg	40,5
Vitamin B ₁₂	µg	0,4
Pantothensäure	mg	0,7
Biotin	µg	7,5
Cholin*	mg	55

* Eicosapentaensäure (EPA), ** Docosahexaensäure (DHA)
° Retinoläquivalente, °° Alpha-Tocopherol Äquivalente (-TE), °°° Niacin Äquivalente (NE)



Hinweise für den Anwender

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät):

Zum Diätmanagement bei Patienten mit bestehender oder drohender Mangelernährung, insbesondere bei erhöhtem Eiweißbedarf und mittlerem Energiebedarf.

Dosierung/Empfohlene Tagesmenge:

Durch den behandelnden Arzt entsprechend der Bedürfnisse des Patienten festzulegen.
Zur ausschließlichen Ernährung: ≥ 1500 ml (1800 kcal)

Wichtige Hinweise:

Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Eine Koagulation (Ausfällung von Nahrungseiweiß) im Verdauungstrakt kann z.B. durch eine Wechselwirkung mit Arzneimitteln auftreten. Zufuhr rate kontrollieren. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Auf adäquate Flüssigkeitszufuhr achten. **Nicht für die parenterale (i.v.) Anwendung!**

Anwendungshinweise:

Empfohlener Sondendurchmesser: ≥ CH 5 bei pumpenassistierter Verabreichung [®], bei Schwerkraftapplikation ↓↓ ≥ CH 8. Bei Raumtemperatur lagern. Geöffnet innerhalb von 24 h aufbrauchen. Vor Gebrauch schütteln. Nicht verwenden bei beschädigtem/aufgeblähtem Beutel oder koaguliertem Inhalt. Nicht mit Arzneimitteln mischen.

Kontraindikationen:

Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen einen in Fresubin 1800 Complete enthaltenen Inhaltstoffe. Nicht geeignet bei Galaktosämie. Nicht geeignet bei Kindern < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.

Zutaten

Wasser, Maltodextrin, Natriumcaseinat (aus Milch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Inulin, Calciumcaseinat (aus Milch), Weizendextrin, Kaliumcitrat, Zellulose, Natriumcitrat, Fischöl, Calciumchlorid, Emulgatoren (Sojalecithin), Cholinchlorid, Natriumchlorid, Calciumphosphat, Magnesiumoxid, Säureregulator (E 330), Vitamin C, Stabilisator (E 452), Eisendiphosphat, Zinksulfat, Niacin, Manganchlorid, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B₁, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Vitamin B₂, Vitamin B₆, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdän, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B₁₂.

Bestellinformationen

Packungsgröße	Artikel-Nr.	PZN	Geschmack
EasyBag/5 x 1500 ml	7585241	3594431	neutral



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstraße 36, 8055 Graz
www.fresenius-kabi.at
Tel: 0316/249 - 0
Fax: 0316/249 - 1422
E-Mail: fresubin.at@fresenius-kabi.com